

“1”から学ぶ「レビー小体病」

症例から学ぶ鑑別診断

DLBSN東京シンポジウム

2017年 2月 4日


DLBSN東京協力医

かわさき記念病院

福井俊哉

DLB225例の紹介時診断 (2014/5~2016/9 福井診察)

Probable/Possible 164/61; 平均82.5歳(53~98); M/F 130/95



Others: depression 3, FTD 2, SD/AGD/iNPH/neurosis 1

どうしてDLB診断は困難なの？

- 「典型的DLB」のイメージが強い
- 認知・精神・身体・自律神経症状

が種々な組み合わせ・程度で出現

- CT/MRIに特徴的な所見を欠く
- MIBG心筋シンチ・DaTSCANが高価／施設限定

どうしてアルツハイマー病と誤診されるのか

アルツハイマー病

- もの忘れ
- 道に迷う
- 歩行障害がない

レビー小体病

- もの忘れ
- 道に迷う
- 歩行障害がない場合
- うつ・怒りやすい
- 理不尽な執拗な行動
- 歩行障害・早期の尿失禁
- 幻視・幻聴・妄想

どうして血管性認知症と誤診されるのか

血管性認知症

- もの忘れ
- アパシー
- 怒りやすい
- 歩行障害・早期の失禁

レビー小体病

- もの忘れ
- アパシー
- 怒りやすい
- 歩行障害・早期の尿失禁
- 理不尽な執拗な行動
- 幻視・幻聴・妄想

どうして前頭側頭型認知症と誤診されるのか

前頭側頭型認知症

- 計画性欠如・衝動性
- アパシー
- 社会的に不適切な行為
- 早期の尿失禁
- 身なりが不潔

レビー小体病

- 物の忘れ
- 道に迷う
- 計画性欠如・衝動性
- アパシー
- 理不尽な執拗な行動
- 早期の尿失禁
- 幻視・幻聴・妄想

どうして遅発性統合失調症と誤診されるのか

遅発性統合失調症

- 幻聴・妄想
- 理不尽な行動
- させられ体験
- 会話にまとまりがない
- 引きこもり・無為

レビー小体病

- もの忘れ
- 道に迷う
- うつ・怒りやすい
- 歩行障害
- 早期の尿失禁
- 幻視・幻聴・妄想
- 理不尽な執拗な行動

まとめ

- DLBが誤診されやすい疾患と理由
 - アルツハイマー病
 - 物忘れ，最も多いから・・・
 - 血管性認知症
 - 感情障害，思考緩慢，歩行障害，画像の安易な解釈
 - 前頭側頭型認知症
 - 感情・行動障害
 - 統合失調症
 - 幻覚・妄想，行動障害